



Forbrug af sundhedsydelser, syge fravær og omfanget af patienter med laterale hoftesmerter, der har fået diagnosen "Trokanter bursit", i Region Midtjylland

Jeppé Lange¹, Mathias Høgsholt², Signe Kierkegaard-Brøchner², Katrine Svenden¹, Marie Bagger Bohn¹, Martin Gade Stisen³

¹Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, ²Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens, ³TVÆRSPOR

Baggrund

Laterale hoftesmerter (LHS) opstår ved alle grader af påvirkning af hostens abduktorer, fra tendinopatier til reelle rupturer af m. gluteus medius og/eller minimus senernes tilhæftning på trokanter major. LHS rammer typisk kvinder i 40-60-årsalderen og påvirker patientens livskvalitet samt erhvervs- og funktionsevne.

I dag mangler der en egentlig opgørelse af størrelsen på patientgruppen, samt et overblik af patientgruppens forbrug af sundhedsydelser, sygefravær og medicin.

Formål

Formålet med projektet er at opgøre hyppigheden af patienter med laterale hoftesmerter i sekundærsektoren, samt at afdække patientgruppens brug af sundhedsydelser, antallet af sygedage samt medicinforbrug og uhensigtsmæssige indlæggelser.

Metode

Projektet udføres i perioden 2024-2027.

Studiet er retrospektivt register-baseret med brug af TVÆRSPOR databasen i perioden 2012-2021. Populationen udgøres af patienter i alderen 18+ med én af SKS-diagnosekoderne DM760 eller DM706, der på et givent tidspunkt i perioden har været bosat i Region Midtjylland.

Yderligere vil brugen af sundhedsydelser, antal sygedage og medicinforbruget for patientpopulationen blive opgjort gennem TVÆRSPOR databasen.

Eftersom formålet lægger op til en opgørelse af patientpopulationen, vil deskriptive statistiske metoder blive benyttet til at analysere og beskrive patienterne.

Projektets forventede anvendelse i praksis

TVÆRSPOR-databasen gør det muligt at opgøre hyppigheden af, og beskrive patientpopulationen med laterale hoftesmerter i hele Region Midtjylland, og dermed give en ide om omfanget af patientgruppen nationalt.

Inddragelsen af patientgruppens brug af sundhedsydelser vil skabe vigtig indsigt i, hvor mange patienter, der i deres forløb behandles med bl.a. binyrebarkhormon-injektioner.

Yderligere vil en opgørelse af antal sygedage forbundet med diagnosen generere ny viden om, hvor stor påvirkning laterale hoftesmerter har.